

# ¿QUÉ SABER ANTES

## DE...?

# VACUNAR DE GRIPE

## INTRANASAL

## LO QUE NO TE CUENTAN



@inma.fernandez.diaz



[www.lavozdelospadres.com](http://www.lavozdelospadres.com)



@autismo\_integral




@por\_que\_callar

# FLUMIST - FLUENZ

PRODUCIDAS EN CÉLULAS VERO (RÍNÓN DE MONO) POR TECNOLOGÍA GENÉTICA INVERSA. ESTE PRODUCTO **CONTIENE ORGANISMOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE (OMG).**

- MEDICAMENTO CON **SEÑAL DE TRIÁNGULO NEGRO INVERTIDO:** SIN DATOS SUFICIENTES DE SEGURIDAD.



## CONTIENE:

- PROTEÍNAS DEL HUEVO (P. EJ., OVOALBÚMINA) Y GENTAMICINA
- SACAROSA
- HIDRÓGENOFOSFATO DE POTASIO
- DIHIDRÓGENOFOSFATO DE POTASIO
- GELATINA (PORCINA TIPO A)
- CLORHIDRATO DE ARGININA
- MONOHIDRATO DE GLUTAMATO MONOSÓDICO

[https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/1241816001/FT\\_1241816001.html](https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/1241816001/FT_1241816001.html)



@inma.fernandez.diaz



www.lavozdelospadres.com



@autismo\_integral



@por\_que\_callar

# ORGÁNISMO MODIFICADO GENÉTICAMENTE (OMG)

- **ESTUDIOS DICEN: VIRUS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE PUEDAN RECOMBINARSE CON VIRUS SILVESTRES Y RECUPERAR VIRULENCIA O ADQUIRIR NUEVAS PROPIEDADES PATOGÉNICAS.**

› Ciencia.13 de julio de 2012;337(6091):188. doi: 10.1126/science.1217134.

**Las vacunas atenuadas pueden recombinarse para formar virus de campo virulentos.**

Sang-Won Lee <sup>1</sup>, Philip F. Markham, Mauricio JC Coppo, Alistair R Legione, Juan F. Markham, Amir H Noormohammadi, Glenn F. Browning, Nino Ficorilli, Carol A. Hartley, Joanne M. Devlin

Afilaciones + expandir

PMID: 22798607 DOI: 10.1126/science.1217134

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22798607/>

- **SEGÚN EL MISMO PROSPECTO: PUEDEN REPLICARSE Y TRANSMITIRSE A PERSONAS INMUNODEPRIMIDAS, EMBARAZADAS O MUY JÓVENES.**

Se debe comunicar a los receptores de la vacuna que Fluenz Tetra es una vacuna de virus vivos atenuados y tiene potencial de transmisión a contactos immunodeprimidos. Los receptores de la vacuna deben intentar evitar, en lo posible, el contacto estrecho con personas gravemente immunodeprimidas (p. ej., receptores de trasplantes de médula ósea que requieren aislamiento) durante 1-2 semanas después de la vacunación. La incidencia máxima de recuperación del virus vacunal tuvo lugar 2-3 días después de la vacunación en los estudios clínicos con Fluenz. En circunstancias en las que sea inevitable el contacto con personas gravemente immunodeprimidas, el posible riesgo de transmisión del virus vacunal contra la gripe debe evaluarse frente al riesgo de adquirir y transmitir cepas salvajes del virus influenza.

[https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/113887003/FT\\_113887003.html](https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/113887003/FT_113887003.html)



@inma.fernandez.diaz



[www.lavozdelospadres.com](http://www.lavozdelospadres.com)



@autismo\_integral



@por\_que\_llamar

# FLUMIST - FLUENZ

**A TRAVÉS DE LA NARIZ (VACUNA INTRANASAL) HAY UNA VÍA DE ACCESO DIRECTA AL CEREBRO, POR LA LÁMINA CRIBOSA DEL ETMOIDES, UNA DE LAS COMPLICACIONES DE ESTA VACUNA ES LA MENINGOENCEFALITIS.**

**ADEMÁS, EN CUANTO ESTOS NIÑOS ESTORNUDEN, TRASMITIRÁN LOS ENGENDROS VÍRICOS A TODOS SUS CONTACTOS.**

<https://cienciaysaludnatural.com/vacuna-nasal-contra-gripe-relacionada-con-reacciones-graves/>



@inma.fernandez.diaz



@autismo\_integral



@por\_que\_llamar

# FLUMIST - FLUENZ

**SE RETIRÓ DEL MERCADO EN 2016  
EN EE.UU. POR INEFICAZ, LA  
FARMACÉUTICA DIJO  
REFORMULARLA.**

**DESPUÉS, LOS EXPERTOS DEL  
COMITÉ SUAVIZARON SU  
RECOMENDACIÓN HABITUAL  
PARA DEJAR CLARO QUE NO  
ESTABAN PREPARADOS PARA  
RESPALDARLA.**

**MODIFICARON LA REDACCIÓN  
PARA INDICAR QUE LA DECISIÓN  
FINAL RECAE EN LOS MÉDICOS.**

<http://vacunas.org/un-panel-de-los-cdc-afirma-que-la-vacuna-nasal-contra-la-gripe-flumist-no-es-efectiva/>



@inma.fernandez.diaz



www.lavozdelospadres.com



@autismo\_integral



@por\_que\_callar



Avanzado

Ahorrar

Correo electrónico

› Virus.21 de septiembre de 2017;9(10):269. doi: 10.3390/v9100269.

## La vacuna antigripal viva atenuada contiene cantidades sustanciales e inesperadas de ARN genómico viral defectuoso.


Philip S. Gould <sup>1</sup>, Andrew J. Easton <sup>2</sup>, Nigel J. Dimmock <sup>3</sup>

Afilaciones + expandir

PMID: 28934167 PMCID: PMC5691621 DOI: 10.3390/v9100269

**OFICIALMENTE LA VACUNA INTRANASAL FLUMIST/FLUENZ TUVO MUY BAJA EFICACIA. ESTUDIOS DESTACABAN QUE CONTENÍA MUCHOS FRAGMENTOS VIRALES DEFECTUOSOS (ARN DI) QUE IMPEDÍAN QUE EL VIRUS ATENUADO SE REPLICARA LO SUFICIENTE PARA GENERAR UNA BUENA RESPUESTA INMUNITARIA.**

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28934167/>



@inma.fernandez.diaz



www.lavozdelospadres.com



@autismo\_integral



@por\_que\_callar

# FLUMIST - FLUENZ

**SOBRECARGAR CON UNA VACUNA  
INEFICAZ UN YA CASTIGADO  
SISTEMA INMUNE POR LA  
HIPERVACUNACIÓN  
CONVENCIONAL INFANTIL, NO  
PARECE UNA BUENA IDEA.**

**EL SISTEMA INMUNE TAMBIÉN  
SUFRE AGOTAMIENTO Y  
REACCIONA CON  
HIPERINFLAMACIÓN, ALERGIAS Y  
ENFERMEDADES AUTOINMUNES.**

<https://cienciaysaludnatural.com/vacuna-nasal-contra-gripe-relacionada-con-reacciones-graves/>



@inma.fernandez.diaz



@autismo\_integral



@por\_que\_callar

# VERSIÓN FLUENZ TETRA

## Población pediátrica

En un estudio clínico controlado con tratamiento activo (MI CP111) se observó un aumento de la tasa de hospitalización (por cualquier causa) hasta 180 días después de la dosis final de vacunación en bebés y niños de 6 – 11 meses (Fluenz 6,1% frente a vacuna inyectable contra la gripe 2,6%). La mayoría de las hospitalizaciones se debieron a infecciones gastrointestinales y del tracto respiratorio y se produjeron después de más de 6 semanas tras la vacunación. La tasa de hospitalización no se vio incrementada en los receptores de Fluenz mayores de 12 meses. En el mismo estudio se observó un aumento de la tasa de sibilancias hasta 42 días en bebés y niños de 6 – 23 meses (Fluenz 5,9% frente a vacuna inyectable contra la gripe 3,8%). La tasa de sibilancias no se vio incrementada en los receptores de Fluenz mayores de 24 meses. Fluenz Tetra no está indicado para uso en bebés ni en niños menores de 24 meses (ver sección 4.2).

Se han observado también casos muy raros del síndrome de Guillain Barré y de exacerbación de los síntomas del síndrome de Leigh (encefalomiopatía mitocondrial) durante el periodo de comercialización de Fluenz.

## Población pediátrica

- (...) **Se observó un aumento de la tasa de hospitalización (por cualquier causa) hasta 180 días después de la dosis final de vacunación en bebés y niños de 6 – 11 meses (Fluenz 6,1% frente a vacuna inyectable contra la gripe 2,6%).**
- **En el mismo estudio se observó un aumento de la tasa de sibilancias hasta 42 días en bebés y niños de 6 – 23 meses (Fluenz 5,9% frente a vacuna inyectable contra la gripe 3,8%).**
- **Se han observado también casos muy raros del síndrome de Guillain Barré y de exacerbación de los síntomas del síndrome de Leigh (encefalomiopatía mitocondrial) durante el periodo de comercialización de Fluenz".**

[https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/113887003/FT\\_113887003.html](https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/113887003/FT_113887003.html)



@inma.fernandez.diaz



@autismo\_integral




@por\_que\_llamar


+ COBERTURA VACUNA  
= + GRIPE

# COBERTURA VACUNA GRIPE 2023-24 VS 2024-25

NIÑOS 1 A 5 AÑOS



2023-24 = 37.2%  
2024-25 = 48.2%



@inma.fernandez.diaz



@autismo\_integral



@por\_que\_callar

# GRÍPE POR EDADES 2023-24 VS 2024-25

**COBERTURA VACUNA 2023-24 = 37.2%**  
**COBERTURA VACUNA 2024-25 = 48.2%**

Muestras y positividad para gripe, SARS-CoV-2 y VRS por grupos de edad. SiVIRA, temporada 2023-24			
Edad	Muestras gripe	Detecciones gripe	Positividad gripe
<1	1.457	63	4,3
1-4	3.288	279	8,5
5-14	4.244	491	11,6

[https://docsivira.isciii.es/informe\\_semanal\\_SiVIRA\\_202439.html](https://docsivira.isciii.es/informe_semanal_SiVIRA_202439.html)

Muestras y positividad para gripe, SARS-CoV-2 y VRS por grupos de edad. SiVIRA, temporada 2024-25			
Edad	Muestras gripe	Detecciones gripe	Positividad gripe
<1	1.266	86	6,8%
1-4	3.366	421	12,5%
5-19	5.768	1.477	25,6%

[https://docsivira.isciii.es/Informe\\_semanal\\_SiVIRA\\_202537.html](https://docsivira.isciii.es/Informe_semanal_SiVIRA_202537.html)



@inma.fernandez.diaz



www.lavozdelospadres.com



@autismo\_integral



@por\_que\_llamar

# SISTEMA DE REGISTROS DE EFECTOS ADVERSOS EN EE.UU. (VAERS)

> *Pediatr frontal*.2025 septiembre 2:13:1640498. doi: 10.3389/fped.2025.1640498.

Colección electrónica 2025.

**Análisis de seguridad basado en farmacovigilancia a los 12 años de la comercialización de vacunas antígripales tetravalentes en niños: un estudio de vigilancia del VAERS**

Hong Hong Fu <sup>1</sup>, Yirong Huang <sup>2</sup>, Xinjin Wang <sup>1</sup>, Ying Zhang <sup>3</sup>, Yijie Liu <sup>1</sup>, Yonglong Su <sup>4</sup>, Lili Pan <sup>5</sup>

Afilaciones + expandir

PMID: 40963961 ID de PMC: PMC12436442 DOI: 10.3389/fped.2025.1640498

**DE LOS 15.458 EVENTOS ADVERSOS NOTIFICADOS, EL 5,29 % (IC DEL 95 %: 4,95-5,65) SE CLASIFICARON COMO GRAVES, INCLUYENDO 67 FALLECIMIENTOS. EL SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ (SGB) SE IDENTIFICÓ COMO UNA SEÑAL DE SEGURIDAD ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVA (42 CASOS; ROR = 1,71; IC DEL 95 %: 1,25-2,35; IC025 = 0,28).**

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40963961/>



@inma.fernandez.diaz




[www.lavozdelospadres.com](http://www.lavozdelospadres.com)



@autismo\_integral



@por\_que\_llamar



# NO LO OLVIDES:

**#Cuestiona  
#Investiga  
#Despierta  
#Comparte**



 @inma.fernandez.diaz



 @autismo\_integral



 @por\_que\_callar