


No hay que ser médico para...



@inma.fernandez.diaz



www.lavozdelospadres.com



@autismo_integral



@por_que_callar

1. Entender que las vacunas necesitan un **seguimiento temporal mayor a 2 o 5 días** antes de ser aprobadas.

Días de seguimiento de algunas vacunas:

Engerix-GSK = 4 DÍAS


Hep B (Recombivax-Merck) = 5 DÍAS

Polio (IPOL-Sanofi Pasteur) = 2 DÍAS

Hib (Pedvax-Merck) = 3 DÍAS

Hib (Hiberix-GSK) = 4 DÍAS

<https://icandecide.org/article/childhood-vaccine-trials-summary-chart/>



@inma.fernandez.diaz



www.lavozdelospadres.com



@autismo_integral



@por_que_callar

2. Entender que si no comparas una nueva vacuna con un grupo que reciba **placebo** no puedes conocer sus efectos reales.

ICAN
Informed Consent Action Network

None of the vaccine doses the CDC recommends for routine injection into children were licensed by the FDA based on a long-term placebo-controlled trial

Type	Doses	Projected Age ¹	Brand	Manufacturer	Control	Placebo ²	Safety Review After Injection ³	Source	Note
HepB	3	Birth 1M 6M	Recombivax HB	M	None	NO	5 days	NO Package insert at § 6.1	Note that to license a vaccine for children, the FDA relies upon the clinical trial conducted with children, not adults, because as the FDA explains, "It's important that the public recognize that, because young children are still growing and developing, it's critical that thorough and robust clinical trials of adequate size are completed to evaluate the safety and the immune response to a... vaccine in this population. Children are not small adults!"
DTaP	15	2M 4M/M 15M 4Y	Infanrix	G	DTP	NO	30 days	NO Package insert at § 6.1	DTP was also not licensed based on a placebo controlled trial and it increases mortality .
PCV	4	2M 4M 6M 12M	Daptacel	S	DT or DTP	NO	Up to 2 months + 1 trial 6 months	NO Package insert at § 6.1	The 6-month Daptacel trial had no control, 1,454 children and [within 30 days following any dose of DAPTACEL, 3.9% subjects reported at least one serious adverse event].
IPV	4	2M/M 6M 4Y	Prevmar 13, PCV-13	P	Prevmar 7	NO	6 months	NO Package insert at § 6.1	Prevmar 7 trial's control was an "[i]nvestigational menemopneococcal group C conjugate vaccine." In Prevmar 13 trial, "[s]erious adverse events reported following vaccination in infants and toddlers occurred 8.2% among Prevmar 13 recipients and 7.2% among Prevmar 7 recipients." In Vaxneuvance trial, "[s]erious adverse events... were reported 9.6% of VAXNEUVANCE recipients and by 8.9% of Prevmar 7 recipients" but note "safe" because "no notable patterns or relevant differences were observed between the two groups." 20 hours later result split into "serious adverse events" and "newly diagnosed chronic medical conditions."
Hib	3 or 4	2M 4M or 6M 12M	Vaxneuvance PCV-15	M	Prevmar 13	NO	6 months	NO Package insert at § 6.1	IPOL is very different than the polio vaccine created by Jonas Salk in the 1950s (used until 1960s). Hence, trials of Salk's vaccine from the 1950s were not relied upon to license IPOL.
RV ⁴	2 or 3	2M 4M 6M	Prevnar 20	P	Prevmar 13	NO	6 months	NO Package insert at § 6.1; Clinical review at 20-21	Within 30 days of injection in the ActHib trial, 3.4% experienced a serious adverse event but "[n]one was assessed by the investigators [Sonali] as related to the study of vaccines."
Covid19	3	6M 7M 10M	Community	P	Placebo	YES	6 months	NO Package insert at § 6.1	Lyophilized PedvaxHIB vaccine, used as the control for Liquid PedvaxHIB, was tested in a trial in which controls were given placebo, OPV, and DTP but there is no indication Lyophilized PedvaxHIB was ever licensed.
Flu	19	6M Yearly	Various	MMR	Flu shots change annually without any clinical trial	NO	Flu shots change annually without any clinical trial	NO CDC 22-23 Flu Shots: FDA Flu shots	[T]here were 68 (0.19%) deaths following ROTARIX, and 50 (0.15%) deaths following placebo.... The most common...cause...was pneumonia...observed in 19 (0.05%) recipients of ROTARIX and 10 (0.03%) placebo recipients." Its clinical review admits "[t]he placebo consisted of a combination of Rotavirus and RSV, and the placebo did not contain a placebo insert for RotaTeq." [In]one was assessed by the investigators [Sonali] as related to the study of vaccines."
MMR	6	12M 4Y	M-M-R-II	M	None	NO	42 days	NO Clinical reports	M-M-R-II trials totaled only 834 children and a third developed gastrointestinal issues and a third respiratory issues. In Priorix trial, both vaccine groups had high rate of serious adverse events, emergency room visits, and new chronic diseases (e.g., autoimmune disorders, asthma, type 1 diabetes, celiac, and allergies). See Table 6 of the Supplementary Materials.
VAR	2	12M 4Y	Varivax	M	M-M-R-II	NO	6 months	NO Package insert at § 6.1; Sust materials at 12	One controlled trial with 956 children, half Varivax and half neomycin, and one trial with 32 vaccinated and another 29 vaccinated 8 weeks later, during which the first group had double the ear infections and more hospitalizations.
HepA	2	12M 18M	Havrix	G	Engerix-B	NO	6 months	NO Package insert at § 6.1	Incredibly, the section of the same time when there was no licensed Hep A vaccine and hence no excuse for not using a placebo control, it is also starting Engerix-B, see above, was the control for Havrix, and an injection of cyto-and-neuro toxic substances, AAHS and Thimerosal, were used as a control for Vacqta instead of a saline injection.
Tdap	3	11Y	Adacel	S	Td for adults	NO	6 months	NO Package insert at § 6.1	Due to reactions, Tdap (Adacel) given at 11Y has 13.5 times less diphtheria toxoid (25μg v 2μL) and 10 times less pertussis toxin (25μg v 2.5μg) than DTaP (Infanrix) given to babies.
HPV	2 or 3	9Y or 9Y	Gardasil 4 (see note)	M	Gardasil 9	NO	1 month in five trials, 6 months in one trial, and 4 years in one trial	NO Clinical review at 17-19	Gardasil 9 trial gave 306 people placebo after full series of Gardasil 4. In Gardasil 4's trial, controls received aluminum adjuvant, AAHS, except 320 people labeled "Saline Placebo" that actually received all vaccine ingredients except antigens and AAHS. Across trials, 2-3% receiving vaccine or aluminum adjuvant (used to induce autoimmunity) had a suspected autoimmune disorder.
Men4	2	11Y 16Y	Menactra	S	Menomune	NO	6 months	NO Package insert at § 6.1	Incredibly, the safety section of the package insert for Menomune lists the trial in which it was used as a control for trial of Menactra. This provides another good example of the safety pyramid scheme in which Menomune is licensed without a placebo-controlled trial and then used as the control to license Menactra. Menactra is then used as the control to license Menveo. Menactra's safety baseline was never established in a placebo-controlled clinical trial.
MenB	0 to 2	10Y if indicated	Bexsero	G	See note	NO	30 days	NO Summary basis at 14-15; Clinical review at 40	Bexsero's controls injected with aluminum hydroxide and, in one trial with 120 adolescents, saline injection followed by injection of Menveo and hence FDA labels this an "active control," not a "placebo control" trial. Trumeba's trials had no placebo control group other than 12 people in a dose ranging phase II study; otherwise, the controls were injected with Gardasil+placebo, dTaP-IPV+placebo, HepA+placebo, or Menactra+dacel+placebo.
PPSV23	0 to 2	2Y if indicated	Trumenba	P	See note	NO	30 days in 3 trials + 1M in 2 trials	NO Summary basis at 4; Clinical review at 9-10	Licensed for children 2 years and older but there is no indication that there was any clinical trial involving anyone younger than 16 years of age that the FDA relied upon to license this vaccine. See all FDA documentation for this vaccine linked.
DEN	0 to 3	6Y+ given in areas of endemic	Dengvaxia	S	Placebo	YES	5 years	NO Statistical review at 10; Package insert at 4	Licensed for children 2 years and older but there is no indication that there was any clinical trial involving anyone younger than 16 years of age that the FDA relied upon to license this vaccine. See all FDA documentation for this vaccine linked.

¹ MMR, G-HSV, Sehnoff, P+Pfizer.
² Note that for many trials with "6 months," the review was typically around 30 days after injection with a phone call at 6 months.
³ Note that Flu is given by oral drops and one influenza vaccine is given by nasal spray.

Updated: October 18, 2023

<https://icandecide.org/article/childhood-vaccine-trials-summary-chart/>

NO USAN VERDADERO PLACEBO, usan la vacuna a estudiar frente a otra vacuna, o la misma sin antígeno con toda la carga tóxica.

¿Cómo saben que son seguras para aprobarlas?



@inma.fernandez.diaz



www.lavozdelospadres.com



@autismo_integral



@por_que_callar

3. Exigir **estudios de seguridad** de administrar 73 dosis hasta los 18 años




The screenshot shows the National Library of Medicine's website with a report titled "El calendario de vacunación infantil y la seguridad: Preocupaciones de las partes interesadas, evidencia científica y estudios futuros". The report is from the National Academies Press (EE.UU.) and was published on March 27, 2013. A black arrow points from the text in the image to the following quote in the main text.

Mostrar detalles

Comité de Evaluación de Estudios de Resultados de Salud Relacionados con el Calendario de Inmunización Infantil Recomendado; Junta de Salud de la Población y Práctica de Salud Pública; Instituto de Medicina. Washington (DC): [National Academies Press \(EE.UU.\)](#); 27 de marzo de 2013.

Ningún estudio ha comparado las diferencias en los resultados de salud que algunas partes interesadas cuestionaron entre las poblaciones de niños completamente no inmunizados y los niños completamente inmunizados. Los expertos que se dirigieron al comité señalaron no un conjunto de evidencias que se hubiera pasado por alto, sino más bien el hecho de que la investigación existente no ha sido diseñada para evaluar el calendario de vacunación completo.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK206938/?utm_source



@inma.fernandez.diaz



www.lavozdeospadres.com



@autismo_integral



@por_que_callar

Calendario de Vacunaciones e Inmunizaciones de la Asociación Española de Pediatría
Vacunación sistemática y de rescate en población sin condiciones de riesgo 2026



VACUNA O ANTICUERPO MONOCOLONAL	Embarazadas	Niños (edad en meses)							Niños y adolescentes (edad en años)					
		0	2	4	6	11	12	15	24	4	6	10	12	13-18
Hepatitis B ¹			HB	HB		HB				HB				
Difteria, Tétanos y Tosferina ²	Tdpa		DTPa	DTPa		DTPa				DTPa	DTPa/Tdpa	Tdpa	Tdpa	
Poliomielitis ³			VPI	VPI		VPI				VPI	VPI	VPI	VPI	
Haemophilus influenzae tipo b ⁴			Hib	Hib		Hib				Hib				
Neumococo ⁵			VNC	VNC	(VNC)	VNC				VNC				
Rotavirus ⁶			RV	RV	(RV)									
Meningococo B ⁷			MenB	MenB			MenB			MenB		MenB	MenB	
Meningococos ACWY ⁸			Men ACWY				Men ACWY			Men ACWY		Men ACWY	Men ACWY	
Gripe ⁹	Gripe						Gripe							
SARS-CoV-2 ¹⁰	SARS-CoV-2													
Hepatitis A ¹¹						HA				HA				
Sarampión, rubéola y parotiditis ¹²					SRP	SRP	SRP-Var o SRPV			SRP-Var o SRPV				
Varicela ¹³					Var	Var	Var							
Virus del papiloma humano ¹⁴										VPH	VPH			
Virus respiratorio sincítico ¹⁵	VRS		AcVRS											



Vacunas sistemáticas (Verde) / Rescate en la población sin condiciones de riesgo (Naranja)

CaeP Asociación Española de Pediatría CAV Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones

73 dosis recomendadas por la Asociación Española de Pediatría en el calendario de vacunaciones e inmunizaciones de 2026.

<https://www.aeped.es/enfamilia/salud-en-familia/calendario-inmunizaciones-2026>

No hay marco temporal suficiente para conocer los efectos acumulados de tal despropósito -acentuado los últimos años-.



@inma.fernandez.diaz



www.lavozdelospadres.com



@autismo_integral



@por_que_callar


4. Estudiar la **verdadera historia** de las enfermedades infecciosas, factores de aumento de esperanza de vida y papel de las vacunas.

Según la OMS, la vacuna contra el sarampión ha sido responsable de más del 90 % de las vidas salvadas por la vacunación en Europa en los últimos 50 años. Según ellos, millones de vidas, algo **IMPOSIBLE** como muestran los datos reales de mortalidad por sarampión antes de la vacuna**.

Institut of Medicine: “El nº de infecciones prevenidas por la inmunización es en realidad bastante pequeño comparado con otras intervenciones higiénicas como el agua potable, alimentación, condiciones de vida”.

REFERENCIA IMPRESCINDIBLE: *Desvaneciendo ilusiones: las enfermedades, las vacunas y la historia olvidada*. Libro de Suzanne Humphries.

En España: Investigación del Libro “Entender duele, pero es la única cura”.



@inma.fernandez.diaz



www.lavozdelospadres.com








@autismo_integral



@por_que_callar

**LA NARRATIVA MIENTE, LOS ESTUDIOS ESTÁN MANIPULADOS*

***FALSIFICAN DATOS:** Los períodos no son realistas. Usan de proyecciones de casos y muertes que no corresponden a la realidad y proporciones engañosas. ¡Busca las fuentes de datos de mortalidad para conocer la verdad! Luego busca entender cómo es posible que las vacunas no jugaran el papel que nos dicen.



@inma.fernandez.diaz



www.lavozdelospadres.com



@autismo_integral



@por_que_collar

5. Dudar de la coherencia de ciertos criterios médicos en embarazadas: no comas jamón, pero **inyéctate vacunas** sin estudios suficientes de seguridad, con aluminio y otros tóxicos reconocidos.

VACUNAS & EMBARAZO:
¿Sabes qué te inyectan?

TOSFERINA DIFTERIA TÉTANOS GRIPE COVID-19 VRS ▼* Mismo pinchazo

Octoxinol-9
Trometamol
Hidrocloruro de trometamol
Sacarosa
Manitol (E421)
Polisorbato 80 (E433)
Cloruro de sodio
Ácido clorhídrico
Hemaglutinina
Colesterol
Glicoproteína F
Trazas formaldehído
Nucleósidos modificados, encapsulados en nanopartículas lipídicas
500 µg aluminio
((4-hidroxibutil)azanodiil)bis(hexano-6,1-diil)bis(2-hexildecanoato) (ALC-0315)
2-[(polietilenglicol)-2000]-N,N-ditetradecilacetamida (ALC-0159)
1,2-diestearoil-sn-glicero-3-fosfocolina (DSPC)
30 µg tozinamerán (molécula ARNm sintético)
Trazas células de ovario de hámster chino (OHC) Tecnología ADN recombinante

Triángulo negro (▼): sin datos suficientes de seguridad según prospecto

*ADVERTENCIA TRIÁNGULO NEGRO: sin información suficiente

INYECTADO

COMPONENTES CONTROVERSIOSAS EN VACUNAS Y LAS CRÍTICAS ASOCIADAS

Alérgenos / tóxicos

Aluminio: neurotóxico

Formaldehído: Problemas sistema gastrointestinal, inmunológico, nervioso y reproductivo. Cancerígeno.

Polisorbato 80: detergente mutagénico y cancerígeno

MF59C.1: escualeno, tóxico

Fenol: quemaduras, daño del hígado, orina de color oscuro, latido irregular del corazón.

Glutamano Monosódico: efecto tóxico en el desarrollo fetal, niños, adolescentes y adultos. Complicaciones fisiológicas: hipertensión, obesidad, problemas del tracto gastrointestinal y deterioro de la función del cerebro, el sistema nervioso, el sistema reproductivo y el sistema endocrino.

Anticuerpo monoclonal

Humanizado recombinado producido por tecnología del ADN en células huésped de mielomas (cáncer) de ratón: afecciones autoinmunes y cancerígeno a medio y largo plazo.

Nanopartículas lipídicas

Anafilaxia, miocarditis, pericarditis, estrés oxidativo o inflamación hepática, presencia temporal en hígado y bazo, reacciones inflamatorias crónicas...


ADN fetal

WI-38, MRC-5, HEK-293, PERC6 (líneas celulares de fetos abortados): Integración en el ADN: mutaciones, cancerígeno, autismo...

Proteínas animales

Células Vero (riñón de mono verde africano).
Células MDCK (riñón de perro).
Células C6/36 (mosquito).
Células CHO (ovario de hámster chino).
Albúmina sérica bovina (BSA).
Embriones de pollo.

Contaminación biológica, cancerígenos, enfermedades autoinmune, alergias.



@inma.fernandez.diaz



www.lavozde lospadres.com




@autismo_integral



@por_que_callar

6. Ante un aumento repentino de enfermedades y muertes, dudar de una sustancia experimental nunca antes usada con éxito en humanos...



Int J Riesgo Saf Med. Agosto 2025;36(3):103-112. doi: 10.1177/09246479251336610. Epub 23 de abril de 2025.

Aumento paradójico de las muertes mundiales por COVID-19 con la cobertura de vacunación: estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (2020-2023)


Emmanuel O'Okoro ^{1 2}, Nehemías A. Ikoba ³, Boluwatife y Okoro ⁴, Azibanigha S. Akpila ^{1 5}, Mumeen O Salihu ^{6 7}

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40265700/>


Afilaciones + expandir

PMID: 40265700 DOI: 10.1177/09246479251336610


EXCESO DE MORTALIDAD [0-14] ESPAÑA



SOBREMORTALIDAD FRANJA 0-14 AÑOS



Conclusión: La mortalidad por COVID-19 aumentó durante la era de la vacunación, especialmente en las regiones con mayor cobertura de vacunación.



@inma.fernandez.diaz



www.lavozdelospadres.com



@autismo_integral



@por_que_collar

Cuatro casos de cáncer testicular se han diagnosticado recientemente en la Bundesliga: ¿qué está pasando?. 08/10/22 ¹⁵⁸

¿Qué está pasando en la grada de los estadios españoles? LALIGA. 20/10/22 ¹⁶⁰

Ayer se vivieron dos capítulos más donde los árbitros tuvieron que detener el partido por indisposición de un aficionado.¹⁶¹

El mundo ahora es testigo de una pandemia de ataques cardíacos N-STMI causados por coágulos de sangre.

Cáncer al alza a edades cada vez más tempranas: “En gente joven está aumentando y no se sabe por qué”

El 2022 triplica al 2021 en muertes: ¿Qué causa este aumento preocupante de la mortalidad?

El número de ictus se dobla en toda Andalucía en lo que va de año. 22/07/22 ¹⁶⁷

El exceso de mortalidad en España casi triplica la media europea. 22/08/22 ¹⁶²

Nuestro país está entre los tres estados de la UE con más muertes en junio de 2022, según datos de Eurostat.

¿Por qué se han duplicado los ictus en el mundo? Los neurólogos aseguran que el factor principal no es la COVID-19. 04/08/22 ¹⁶⁶

El exceso de mortalidad se dispara en Baleares un 400 % durante 2022 respecto al primer año de la pandemia. 19/11/22 ¹⁶⁴

Crecen los infartos, los ictus, la muerte súbita y los traumas graves.

Angel Chamorro, neurólogo experto en ictus: «No hay semana en la que no vea a un paciente menor de 30 años»

EL PAÍS

CÁNCER >

Las incógnitas que rodean al auge del cáncer en adultos jóvenes: tumores impredecibles y agresivos

UGT alerta del aumento del 24 % en los fallecimientos por infartos y derrames cerebrales en el trabajo. 13/10/22

¹⁶⁹

DESFIBRILADOR PARO CARDIACO PREVENCIÓN DE RIESGOS

PREOCUPACIÓN POR EL AUMENTO DE INFARTOS EN PERSONAS MENORES DE 45 AÑOS: ALERTA SOBRE SÍNTOMAS Y PREVENCIÓN.

Defibrilador.Com

26 Junio, 2024

El cáncer se dispara entre la generación X y los 'millennials' (y ni la ciencia sabe por qué)

SALUD PÚBLICA • Exceso de mortalidad

España registra un gran exceso de muertes y Sanidad no sabe la causa


Ultima Hora

Noticias | Local

SANIDAD

Los casos de muerte súbita y paro cardíaco crecen en Baleares un 42 % en seis años

El 061 atendió a 507 afectados en 2024, un 10 % de los cuales tenía menos de 30 años



@inma.fernandez.diaz



www.lavozdelospadres.com



@autismo_integral



@por_que_callar

7. DUDAR DE LOS **INTERESES** DE LAS INSTITUCIONES. ¿SON INDEPENDIENTES?

AGENCIAS REGULADORAS

Con potestad para regular y aprobar medicamentos como la Agencia Europea del Medicamento (EMA)

¡NO!

Alrededor del 92,4 % del presupuesto depende de tasas y cánones (de farmacéuticas), el 7,3 % de la contribución de la Unión Europea (UE) para cuestiones de salud pública y el 0,3 % de otras fuentes.

ORGANISMOS

ORGANISMOS como la Organización Mundial de la Salud (OMS)

¡NO!

La Fundación Bill & Melinda Gates es uno de sus principales contribuyentes.

ASOCIACIONES

ASOCIACIONES como la Organización Asociación Española de Pediatría (AEP)

¡NO!

Empresas de alimentación, farmacéuticas y marcas de puericultura pagan cada año cientos de miles de euros a la Asociación Española de Pediatría.

FARMACÉUTICAS

TECNOLOGICAS
MEDIOS COMUNICACIÓN
COMUNIDAD MILITAR Y DE INTELIGENCIA
UNIVERSIDADES


AGENCIAS SALUD REGULADORAS

CDC, NIH, EMA

ALIANZA

TIENEN PATENTES DE MEDICAMENTOS Y VACUNAS.
SE BENEFICIAN DE LAS VENTAS DE PRODUCTOS QUE ELLOS MISMOS APRUEBAN.

- Influencia en redes y medios.
- Farmacéuticas financian medios de comunicación a través de publicidad y accionariado.
- Creación de armas biológicas mediante experimentos de ganancia de función, entre otros. Posterior venta de vacunas.
- Influencia académica y médica, control de las publicaciones, formaciones y narrativa.



@inma.fernandez.diaz



www.lavozdelospadres.com



@autismo_integral




@por_que_callar






8. DUDAR DE LA APARICIÓN MASIVA DE ENFERMEDADES DEL SISTEMA INMUNITARIO TRAS LA MANIPULACIÓN MASIVA DEL SISTEMA INMUNITARIO (VACUNAS)

Las enfermedades del sistema inmune han aumentado en las últimas décadas junto al aumento de las inmunizaciones: diabetes, alergias, esclerosis múltiple, enfermedad celíaca, artritis reumatoide, enfermedades inflamatorias crónicas... así como los cánceres.

Si crees en el poder de los alimentos o tóxicos ambientales, **¿cómo no vamos a considerar los tóxicos inyectados en bebés sanos desde temprana edad y sin estudios de seguridad suficientes?**



Cuadro resumen enfermedades crónicas infantiles en España



@inma.fernandez.diaz



www.lavozdeospadres.com








@autismo_integral



@por_que_collar

“La verdad sale a la luz”



Recursos gratuitos descargables



lavozdelospadres.com/difusion

Deja tu testimonio en la web

TESTIMONIOS

de los padres

lavozdelospadres.com/testimonios

@lavozdelospadres.info

Los padres tenemos mucho por decir.



@inma.fernandez.diaz



www.lavozdelospadres.com



@autismo_integral



@por_que_collar