

¿QUÉ SABER ANTES DE...? VACUNAR DE NEUMOCOCO

NEUMONÍA NEUMOCÓCICA

LO QUE NO TE CUENTAN



VACUNAS
Y AUTISMO

@inma.fernandez.diaz



@autismo_integral




ENTENDER DUELE
Pero es la única **cura**

@por_que_callar

PREVENAR 20

- MEDICAMENTO CON **SEÑAL DE TRIÁNGULO NEGRO INVERTIDO: SIN DATOS SUFICIENTES DE SEGURIDAD.**
- ESTUDIOS DE SEGURIDAD **SIN VERDADERO PLACEBO**, POR LO QUE NO SE CONOCEN LOS DATOS REALES.



- ADSORBIDO EN FOSFATO DE ALUMINIO (125 µg DE ALUMINIO POR DOSIS). **NEUROTÓXICO**
- CONTIENE POLISORBATO 80 (E433): **DETERGENTE ALÉRGENO, MUTAGÉNICO Y CANCERÍGENO**

***PARA LA VACUNA SYNFLORIX (QUE CUBRE OTROS SEROTIPOS DISTINTOS), LA CANTIDAD DE ALUMINIO ES MAYOR 500 µg**

https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/1211612002/FT_1211612002.html
https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/09508003/FT_09508003.html



VACUNAS
Y AUTISMO

@inma.fernandez.diaz



@autismo_integral



ENTENDER DUELE
Pero es la única **cura**

@por_que_callar

PROSPECTO VACUNA PREVNAR 13*

MUERTE SÚBITA DEL LACTANTE

120 Serious Adverse Events in All Infant and Toddler Clinical Studies

121 Serious adverse events were collected throughout the study period for all 13 clinical trials. This
122 reporting period is longer than the 30-day post-vaccination period used in some vaccine trials.
123 The longer reporting may have resulted in serious adverse events being reported in a higher
124 percentage of subjects than for other vaccines. Serious adverse events reported following
125 vaccination in infants and toddlers occurred in 8.2% among Prevnar 13 recipients and 7.2%
126 among Prevnar recipients. Serious adverse events observed during different study periods for
127 Prevnar 13 and Prevnar respectively were: 1) 3.7% and 3.5% from dose 1 to the bleed after the
128 infant series; 2) 3.6% and 2.7% from the bleed after the infant series to the toddler dose; 3)
129 0.9% and 0.8% from the toddler dose to the bleed after the toddler dose and 4) 2.5% and 2.8%
130 during the 6 month follow up period after the last dose.

131 The most commonly reported serious adverse events were in the 'Infections and infestations'
132 system organ class including bronchiolitis (0.9%, 1.1%), gastroenteritis, (0.9%, 0.9%), and
133 pneumonia (0.9%, 0.5%) for Prevnar 13 and Prevnar respectively.

134 There were 3 (0.063%) deaths among Prevnar 13 recipients, and 1 (0.036%) death in Prevnar
135 recipients, all as a result of sudden infant death syndrome (SIDS). These SIDS rates are
136 consistent with published ~~www.cdc.gov/ncipc/sids/sids.htm~~ data from the year 2000.

137 There was 1 hypothesis that there was a causal relationship between Prevnar 13 and SIDS.
138 **Solicited Adverse Events** Hubo 3 (0,063%) muertes entre los receptores de
139 A total of 1,907 Prevnar 13 y 1 (0,036%) muerte en los receptores
140 least 1 dose of Prevnar 13. 1,907 subjects received at least 1 dose of Prevnar 13. 53.6% were Black or African American, 26.2% were Hispanic or Latino, and 20.2% were non-Hispanic and non-Latino and 14.6% were Hispanic or Latino. Overall, 53.6% of subjects were male
141 infants.
142
143

144 The incidence and severity of solicited adverse reactions that occurred within 7 days following
145 each dose of Prevnar 13 or Prevnar administered to U.S. infants and toddlers are shown in
146 Tables 3 and 4.

***PARA ESTUDIAR PREVENAR 20 USARON COMO PLACEBO
PREVENAR 13: 3.664 SUJETOS RECIBIERON AL MENOS 1
DOSIS DE PREVENAR 20 Y 2.323 SUJETOS RECIBIERON
PREVENAR 13 (VACUNA DE CONTROL). SIN PLACEBO REAL**

https://hisunim.org.il/wp-content/uploads/documents/Package_Inserts/Prevnar13_Wyeth.pdf?utm_source



VACUNAS
Y AUTISMO

@inma.fernandez.diaz



@autismo_integral



ENTENDER DUELE
Pero es la única cura

@por_que_callar

VACUNAS ANTINEUMOCÓCICAS

SIN EVIDENCIA DE LA EFECTIVIDAD CLÍNICA DE LA VACUNACIÓN CON PPSV23/PCV13 PARA PREVENIR LOS DESENLAZOS OBSERVADOS A NIVEL POBLACIONAL.

Investigación | [Acceso abierto](#) | Publicado:21 de octubre de 2025

Eficacia en el mundo real de la vacunación antineumocócica contra la neumonía en adultos: un estudio de cohorte poblacional, Cataluña, 2019

[Cinta de Diego-Cabanes](#)  , [Verónica Torras-Vives](#) , [Ángel Vila-Córcoles](#) , [Eva M. Satué-Gracia](#) , [M. José Forcadell-Peris](#) , [Frederic Gómez-Bertomeu](#) , [Leonardo de Esteban-Júlvez](#) , [Hospital Imma-Guardiola](#) , [Cruz M. Fuentes-Bellido](#) , [Anna Ribes-Alcover](#) , [Clara Rodríguez-Casado](#) y [Olga Ochoa-Gondar](#)

[Enfermedades infecciosas de BMC](#) 25 , Número de artículo: 1369 (2025) | [Citar este artículo](#)

<https://doi.org/10.1186/s12879-025-11596-w>

LAS PERSONAS QUE RECIBIERON TANTO LA PCV13 COMO LA PPSV23 TENÍAN UNA PROBABILIDAD SIGNIFICATIVAMENTE MAYOR DE SER HOSPITALIZADAS POR NEUMONÍA Y DE MORIR POR CAUSAS RELACIONADAS CON LA NEUMONÍA EN COMPARACIÓN CON SUS HOMÓLOGOS NO VACUNADOS



VACUNAS
Y AUTISMO

@inma.fernandez.diaz



@autismo_integral



ENTENDER DUELE
Pero es la única **cura**

@por_que_callar

VACUNAS ANTINEUMOCÓCICAS

SIN EVIDENCIA DE LA EFECTIVIDAD CLÍNICA DE LA VACUNACIÓN CON PPSV23/PCV13 PARA PREVENIR LOS DESENLAZOS OBSERVADOS A NIVEL POBLACIONAL.

Investigación | [Acceso abierto](#) | Publicado:21 de octubre de 2025

Eficacia en el mundo real de la vacunación antineumocócica contra la neumonía en adultos: un estudio de cohorte poblacional, Cataluña, 2019

[Cinta de Diego-Cabanes](#)  , [Verónica Torras-Vives](#) , [Ángel Vila-Córcoles](#) , [Eva M. Satué-Gracia](#) , [M. José Forcadell-Peris](#) , [Frederic Gómez-Bertomeu](#) , [Leonardo de Esteban-Júlvez](#) , [Hospital Imma-Guardiola](#) , [Cruz M. Fuentes-Bellido](#) , [Anna Ribes-Alcover](#) , [Clara Rodríguez-Casado](#) y [Olga Ochoa-Gondar](#)

[Enfermedades infecciosas de BMC](#) 25 , Número de artículo: 1369 (2025) | [Citar este artículo](#)

<https://doi.org/10.1186/s12879-025-11596-w>

LAS PERSONAS QUE RECIBIERON TANTO LA PCV13 COMO LA PPSV23 TENÍAN UNA PROBABILIDAD SIGNIFICATIVAMENTE MAYOR DE SER HOSPITALIZADAS POR NEUMONÍA Y DE MORIR POR CAUSAS RELACIONADAS CON LA NEUMONÍA EN COMPARACIÓN CON SUS HOMÓLOGOS NO VACUNADOS



**VACUNAS
Y AUTISMO**

@inma.fernandez.diaz



@autismo_integral




ENTENDER DUELE
Pero es la única **cura**

@por_que_callar

ANTECEDENTES

ÚLTIMA HORA: Un estudio de 2,23 millones de personas encuentra que las vacunas antineumocócicas aumentan el riesgo de neumonía y muerte

Un estudio con 2.23 millones de personas encuentra que las vacunas antineumocócicas aumentan el riesgo de neumonía y muerte



PCV13

+83% riesgo de neumonía neumocócica

+55% riesgo de neumonía por cualquier causa

+91% riesgo de muerte



PPSV23

+21% riesgo de neumonía neumocócica

+24% riesgo de neumonía por cualquier causa

Sin reducción de la mortalidad



**VACUNAS
Y AUTISMO**

@inma.fernandez.diaz



@autismo_integral




ENTENDER DUELE
Pero es la única **cura**

@por_que_callar

ANTECEDENTES

INFORME DEL MINISTERIO DE SANIDAD (2006)



LOS SEROTIPOS NO VACUNALES HAN AUMENTADO DESDE LA AUTORIZACIÓN DE LA VACUNA PCV-7, APORTANDO EVIDENCIAS DE QUE SE ESTÁ PRODUCIENDO UN REEMPLAZO DE DETERMINADOS SEROTIPOS, FUNDAMENTALMENTE POR EL 19A, 6A Y 1.

AUMENTO DE MENINGITIS NEUMOCÓCICA, HECHO PREOCUPANTE QUE SE HA DETECTADO AL COMPARAR LOS ÚLTIMOS AÑOS CON EL PERÍODO ANTERIOR A LA INTRODUCCIÓN DE LA VACUNA. MUY ESPECIALMENTE EN MENORES DE 1 AÑO.

EL MARCADO INCREMENTO DE SEROTIPOS NO VACUNALES EN ENFERMEDAD INVASORA, ESPECIALMENTE ALGUNOS DE ALTA VIRULENCIA, (SEROTIPO 1), PUEDE ESTAR RELACIONADO CON EL **AUMENTO DE FORMAS DE NEUMONÍA COMPLICADA O CON LA MAYOR INCIDENCIA DE FORMAS GRAVES.**

INCREMENTO EN LA INCIDENCIA Y GRAVEDAD DEL EMPLEMA PLEURAL [...] CON MAYOR VIRULENCIA.

<https://www.sanidad.gob.es/areas/promocionPrevencion/vacunaciones/comoTrabajamos/docs/neumo.pdf>



VACUNAS
Y AUTISMO

@inma.fernandez.diaz



@autismo_integral



ENTENDER DUELE
Pero es la única **cura**

@por_que_callar

¿QUÉ DICE LA OMS?

Se ha reportado un aumento del riesgo de hospitalización dentro de los 60 días posteriores a recibir la vacuna neumocócica conjugada heptavalente (PCV7) por asma y otitis media en estudios previos a la autorización (Eskola et al., 2001).

También se observó un riesgo duplicado de sibilancias (dificultad respiratoria con silbidos) dentro de los dos meses posteriores a la vacunación en los receptores de la vacuna PCV en comparación con los receptores de la vacuna conjugada antimeningocócica C (Black, 2000).

Además, la hospitalización por enfermedad reactiva de las vías respiratorias o asma diagnosticada por un médico más allá de los 31 días también se notificó con mayor frecuencia en los receptores de la vacuna neumocócica conjugada 9-valente —riesgo relativo 1,79 (P = 0,009) (Klugman, 2003).

En este mismo estudio, que incluyó a 19.922 receptores de la vacuna y 19.914 sujetos que recibieron placebo, la hospitalización por neumonía viral asociada dentro de los 8 días posteriores a la vacunación (en niños no infectados por VIH) fue más frecuente en el grupo vacunado (30 vs. 15 casos, P = 0,03).

<https://www.who.int/publications/m/item/pneumococcal-vaccine-information-sheet>



**VACUNAS
Y AUTISMO**

@inma.fernandez.diaz



@autismo_integral



ENTENDER DUELE
Pero es la única **cura**

@por_que_callar

CONSECUENCIAS

LAS VACUNAS AUMENTAN LA VIRULENCIA DE OTROS SEROTIPOS (REEMPLAZO SEROTIPOS), CON MAYORES INCIDENCIAS Y RIESGOS = UN NUEVO PRETEXTO PARA SACAR MÁS VACUNAS QUE CUBRAN ESOS SEROTIPOS AGRESIVOS CAUSADOS POR VERSIONES ANTERIORES DE VACUNAS.

EN ESTE CASO, PREVENAR 20 SE BASA EN LA (FALSA) SEGURIDAD DE LAS ANTERIORES VERSIONES (SIN USO DE PLACEBO PARA MEDIR EFECTOS REALES).



**VACUNAS
Y AUTISMO**

@inma.fernandez.diaz



@autismo_integral



ENTENDER DUELE
Pero es la única **cura**

@por_que_callar

DATOS VAERS

EL SISTEMA DE **NOTIFICACIÓN DE EVENTOS ADVERSOS** A LAS VACUNAS EN EE.UU.

PARA PREVNAR, 13 Y 20

Muerte	Total	1197
Peligro para la vida	Total	780
Incapacidad permanente	Total	342
Hospitalizado	Total	5997
Otros	Total	59383
Total		66502

***EN MENOS DE 3 AÑOS SOLO EN EE.UU PREVENAR 20 (ACTUAL VACUNA) CUENTA CON:**

- **59 MUERTES**
- **79 PELIGRO PARA LA VIDA**
- **71 INCAPACIDAD PERMANENTE**
- **Y UN TOTAL DE 6275 REPORTES**

EN EUDRAVIGILANCE (EUROPA) HAY UN TOTAL DE 50985 REPORTES DE ESTAS 3 VACUNAS.

<https://wonder.cdc.gov/controller/datarequest/D8;jsessionid=8470EA7292B5492F430FCE1CF154>
<https://www.adrreports.eu/en/search.html#>
Datos a octubre 2025



**VACUNAS
Y AUTISMO**

@inma.fernandez.diaz



@autismo_integral



ENTENDER DUELE
Pero es la única **cura**

@por_que_callar

314.619 REPORTES DE EFECTOS EN LA OMS

Prevena 20 contiene el ingrediente activo **Pneumocococalvacina**.

Existen **314 619** informes sobre este ingrediente activo.

posibles efectos secundarios notificados

- Blood and lymphhatic system disorders (1%, 6 381 ADR)
- Cardiac disorders (1%, 4 888 ADR)
- Congenital, familial and genetic disorders (0%, 693 ADRs)
- Ear and labyrinth disorders (0%, 1 625 ADR)
- Endocrine diisorders (0%, 177 ADRs)
- Eye disorders (1%, 6 183 ADRs)
- Gastrointestinos (6%, 38 370 ADR)
- Genneral disorders and administration site conditions (34%, 218 383 ADRs)
- Hepatobiliary disorders (0%, 823 ADRs)
- Immune system disorders (1%, 8 494 ADR)
- Infecciones e infecciones (8%, 50 604 ADR)
- En jury, poisoning and procedural complicationss (3%, 22 620 ADRs)
- Inversiones (5%, 34 718 ADR)
- Metabolism y nucleósido (2%, 11 238 ADR)
- Musculoskeletal and connective tissue disorders (5%, 35 624 ADRs)
- Neoplasms, náutico y unificado (incl. cysts y polips) (0%, 612 ADR))
- Nervous system disorders (9%, 57 103 ADRs)
- Pregnancy, puerperium and perinatal conditions (0%, 146 ADRs)
- Product issues (0%, 895 ADRs)
- Psychiatric disorders (4%, 25 956 ADR)
- Renal and urinary disorders (0%, 1 665 ADRs)
- Reproductive system and breast disorders (0%, 541 ADR)
- Reespiratory, thoracic and mediastinal disorders (4%, 22 848 ADRs)
- Skin and subcutaneous tissue disorders (11%, 68 623 ADRs)
- Sociales (1%, 7584 ADR)
- Surgical and medical procedures (1%, 4 971 ADRs)
- Vascular disorders (3%, 17 167 ADR)

<https://vigiaccess.org/>



**VACUNAS
Y AUTISMO**

@inma.fernandez.diaz



@autismo_integral



ENTENDER DUELE
Pero es la única **cura**

@por_que_callar

NO LO OLVIDES:

#Cuestiona
#Investiga
#Despierta
#Comparte



VACUNAS
Y AUTISMO

@inma.fernandez.diaz



@autismo_integral



ENTENDER DUELE
Pero es la única cura

@por_que_callar